태백산에 피고 지는

우리 꽃

민족의 영산 태백산은 백두에서 시작되어 남쪽으로 흐르던 백두대간이 지리산 방향으로 기우는 분기점에 위치해 있다. 1989년 도립공원으로 지정된 후 27년 만에 구역을 넓혀 22번째 국립공원으로 지정되었다. 강원도(태백시, 영월군, 정선군)와 경상북도(봉화군)에 걸쳐 지정되었으며, 면적은 70.052㎢이다.



태백산은 수 천년 간 제천의식을 지내던 천제단과 한강의 발원지인 검룡소 등 문화자원이 분포하고 있다. 국내 최대 야생화 군락지인 금대봉~대덕산 구간, 장군봉 주변의 주목군락지, 세계 최남단 열목어 서식지인 백천계곡 등 다양하고 뛰어난 생태 경관자원을 보유하고 있다.





천제단



금대봉 야생화

태백산 명소

천제단_

태백산 정상에 자연석을 쌓아 만든 3기의 제단으로 영봉에 위치한 가장 큰 천왕단을 중심으로 장군봉에 있는 장군단, 천왕단 남쪽 아래에 있는 하단으로 구성되어 있다.
천제단은 '삼국사기'를 비롯한 여러 기록에서 신산(神山)으로 섬겨져 제천(祭天)[1]의식의 장소임을 밝히고 있으며 천제단 역시 이러한 의식을 행하기 위해 만든 제단이다. 천왕단은 2m남짓한 높이로 남쪽으로 계단을 조성한 원형제단이다. 그 위에 자연석 제단과 대종교[2]에서 단군을 모신 장소로 성역화하는 과정에서 세운 것으로 알려진 '한배검(단군왕검을 높여 부르는 말)'이 적힌 비석이 있다.

금대봉_

금대봉에서 대덕산으로 이어지는 산길은 '하늘의 정원'으로 불리는 국내 최대의 야생화 군락지이다. '금대'란 '신이 사는 곳'이라는 뜻의 '검대'에서 유래되었다. 금대봉(1,418m)과 대덕산(1,307m) 일대(4.2㎢)는 환경부 지정 생태·경관보전지역으로 지정한 곳으로 천상의 화원이라 불리는 곳이다. 특히 한국 특산식물 15종류와 희귀식물 16종류가 자생하고 있으며 한국미기록종 곤충 13종이 발견되는 등 생태계의 보고이다.

[1] 제천의식 : 하늘을 숭배하고 제사를 지내는 의식
[2] 한국의 민족기원 신화에서 비롯되었으며, 교리에 민족의 정통사상과 철학을 담고 있다.



검룡소



주목군락지

검룡소_

1987년 국립지리원에서 실측 결과 한강의 최장 발원지로 공식 인정된 곳으로 약 514㎞를 흘러 서해바다(황해)에 이르는 시발점이다. 깊이를 알 수 없는 검룡소는 석회암반을 뚫고 하루 약 2천t의 지하수가 솟아오르고 있는 곳이다. 전설에 이르기를 옛날 서해 바다에 살던 이무기가 용이 되고자 한강을 거슬러 올라와 이곳에 머무르고 있다는 전설이 있으며, 물이 솟아오르는 연못에 검룡(이무기)이 살고 있다 해서 '검룡소(儉龍沼)'라 이름 붙였다. 용틀임하는 것처럼 암반이 파인 것은 이무기가 연못으로 들어가기 위해 몸부림 친 자국이라 전해진다.

장군봉 주목군락지_

국내 주목서식지중 가장 큰 서식지로서 2,800여 그루가 있으며, 그 중 지름이 1m가 넘어 수령 5백년가량 된 주목이 15그루나 된다. 우리나라 주목 서식지 중 가장 대단위 군락지를 형성하고 있고 태백산을 대표하는 나무이다. 특히 겨울철 설경은 장관을 이룬다.





백천계곡



만항재 야생화

백천계곡_

천연기념물 제74호로 지정된 봉화군 대현리 열목어 서식지가 위치한 곳으로 열목어(멸종위기야생생물 2급)가 집단 서식하고 있다. 특히 세계에서 열목어가 살 수 있는 최남단지역으로 천연기념물로 지정하여 관리하고 있다. 열목어는 연어과에 속하는 민물고기로 연중 20℃이하의 차가운 물에만 서식한다.

함백산_

태백산국립공원의 최고봉(해발 1,573m)으로 국내 최대 규모의 야생화 군락지이며, 해발 1,000m가 넘는 고산지대에서 자생하고 있는 다양한 야생화를 한자리에서 관찰할 수 있다.



1
spring

태백의

봄



각시붓꽃

Iris rossii Baker 붓꽃과

꽃은 4~5월 꽃줄기 끝에 1개씩 피며, 보통 보라색이나 드물게 흰색도 있다. 일반 붓꽃에 비해 작고 예뻐서 각시붓꽃이라고 이름 지어졌다.



갈퀴현호색

Corydalis grandicalyx B. U. Oh & Y. S. Kim 현호색과

꽃은 전체적으로 진한 청색을 띄며 5월 초순경에 핀다. 꽃이 피면 꽃받침이 갈퀴모양으로 가늘고 깊게 갈라져 갈퀴현호색이라고 이름 지어졌다.



감자난초

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. 난초과

꽃은 5~6월 황갈색으로 층층이 핀다. 뿌리와 줄기 사이에 감자처럼 생긴 알모양의 줄기가 있어서 감자난초라고 이름 지어졌다.

구슬붕이

Gentiana squarrosa Ledeb. 용담과

4~5월 연한 보라색의 꽃이 가지 끝에 달린다. 열매가 맺히는 모습이 마치 구슬을 담고 있는 모양이라 하여 구슬붕이라고 이름 지어졌다.





2017. 05. 금강애기나리

금강애기나리

Streptopus ovalis (Owhi) F. T. Wang & Y. C. Tang 백합과

4~6월 줄기 끝에 자주색 반점이 있는 황백색 꽃이 핀다. 꽃은 1~2개씩 피어나며 꽃잎은 6개이다. 잎은 긴 달걀모양으로 끝이 뾰족하고 잎 밑이 줄기를 감싼다.





금강제비꽃

Viola diamantiaca Nakai 제비꽃과

6~7월 흰색이나 연한 자주색의 꽃이 핀다. 제비꽃은 제비가 돌아올 무렵에 꽃이 핀다는 데서 유래했고, 금강산에서 처음 발견되어 금강제비꽃이라고 이름 지어졌다.



꽃쥐손이

Geranium eriostemon Fisch. ex DC. 쥐손이풀과

5~8월 연한 자주색 꽃이 꽃줄기 끝에 2~7개 모여난다. 열매 자루가 익으면서 다섯 갈래로 갈라지는 모양이 마치 쥐 손바닥같아 쥐손이라 부르고, 쥐손이꽃 중 꽃이 가장 화려해 꽃쥐손이라고 이름 지어졌다.





꿩의바람꽃

Anemone raddeana Regel 미나리아재비과

4~5월 줄기 끝에 흰색 꽃이 핀다. 꽃잎이 10개 이상으로 많은 수가 달려 다른 바람꽃들과 쉽게 구별된다. 습한 곳에서 자라며 키는 15~20cm 가량이다.

나도개감채

Lloydia triflora (Ledeb.) Baker 백합과

4~5월 줄기 끝에 2~6개의 흰색바탕에 녹색 줄이 있는 꽃이 달린다. 개감채와 비슷하게 생겨서 나도개감채라고 이름 지어졌다.



나도바람꽃

Isophyrum raddeanum (Regel) Maxim 미나리아재비과

강원도 산지에서 자라는 꽃으로 4~6월 위를 향해 피며 흰색 또는 분홍빛이 도는 흰색이다.



나도범의귀

Mitella nuda L. 범위귀과

5~6월 안테나 모양의 녹색 꽃이 듬성듬성 어긋나게 피어난다. 키는 15~25cm 가량이며, 북방계 희귀식물로 개체수가 적어 보호가 필요한 종이다.





나도옥잠화

Clintonia udensis Trautv. & C. A. Mey. 백합과

6~7월 흰색 꽃이 줄기 끝에 모여 핀다. 꽃잎은 6장이고 잎은 두꺼운 긴 타원형이다. 높은 산 숲 속에서 자라며 희귀하다.



나도제비란

Galearis cyclochila (Franch. & Sav.) Soo 난초과

5~6월 연한 분홍 반점이 있는 흰색 또는 연한 분홍색 꽃이 피어 난다. 높은 산에서 자라며, 키는 10~15cm 가량이다.







너도바람꽃

Eranthis stellata Maxim 미나리아재비과

3~4월 흰색 꽃이 줄기 끝에 1송이씩 핀다. 꽃잎처럼 보이는 꽃받침이 5~7장 달려있고, 키는 10~15cm 가량이다.

노란장대

Sisymbrium luteum (Maxim) O. E. Schulz 십자화과

5~6월 줄기 끝에서 주걱 모양의 노란 꽃잎이 4갈래로 갈라져 핀다. 높은 산 양지바른 곳에 자라며, 키는 80~120cm 가량이다.





노랑갈퀴

Vicia chosenensis Ohwi 콩과

6월 자줏빛이 도는 노란색 꽃이 잎겨드랑이에서 아래를 향해 한 줄로 빼곡히 모여 난다. 줄기는 곧게 서고 전체에 털이 없다. 키는 80~100cm 가량이다.





노랑무늬붓꽃

Iris odaesanensis Y. N. Lee 붓꽃과

5~6월 흰색으로 꽃이 피는데, 주걱 모양의 꽃잎 아랫부분에 황색의 무늬가 있다. 열매는 6~7월에 익고 짧은 부리모양이다. 키는 13~20cm 가량이다.

노랑제비꽃

Viola orientalis (Maxim.) W. Becker 제비꽃과

4~5월 줄기 끝에 노란 꽃이 피어나 무리를 지어 꽃무리를 이룬다. 줄기는 곧게 서고 잎은 하트모양이다.



노루귀

Hepatica asiatica Nakai 미나리아재비과

3~5월 잎보다 먼저 꽃이 피는데 꽃은 흰색, 분홍색, 보라색으로 6~11장의 꽃잎이 보인다. 꽃줄기나 잎이 올라올 때의 모습이 마치 노루의 귀를 닮아 노루귀라고 이름 지어졌다.





노루삼

Actaea asiatica H. Hara 미나리아재비과

5~6월 줄기 끝에 흰색의 꽃이 솔 모양으로 빽빽하게 모여 핀다. 줄기는 곧게 서며 키는 40~70cm 가량이다.



당개지치

Brachybotrys paridiformis Maxim. ex Oliv. 지치과

4~5월 자주색 또는 보라색 꽃이 5송이 정도 모여 피며 아래를 향한다. 잎은 줄기 끝에 5~6장이 돌려나고 키는 40cm 가량이다.



대성쓴풀

Anagallidium dichotomum (L.) Griseb. 용담과

멸종위기 야생생물 Ⅱ급종으로 5~6월 녹색이 도는 흰색 꽃을 잎겨드랑이와 가지 끝에서 피워낸다. 대덕산에서 처음 발견되어 대성쓴풀이라고 이름 지어졌다.







동의나물

Caltha palustris L. 미나리아재비과

4~5월 노란 꽃이 줄기 위쪽에 2~4개씩 달리며, 꽃잎은 5~7장이다. 오므린 잎 모양이 물동이를 닮아서 동의나물이라고 이름 지어졌다.

두루미꽃

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 백합과

5~6월 흰색 꽃이 줄기 위쪽에 20송이 정도 둥글게 층을 이루며 핀다. 잎의 모양이 두루미가 날개를 펼친 모습과 닮아서 두루미꽃이라고 이름 지어졌다.





등칡

Aristolochia manshuriensis Kom. 쥐방울덩굴과

5~6월 꼬부라진 통모양의 꽃이 잎겨드랑이에 1송이씩 달린다. 잎 모양이 칡을 닮아서 등칡이라고 이름 지어졌다.







매발톱나무

Berberis amurensis Rupr. 매자나무과

5~6월 노란 꽃 10~20개가 모여핀다. 꽃잎은 6장이며 긴 달걀모양이다. 잎과 줄기가 연결되는 곳에 매 발톱같은 날카로운 가시가 3개씩 달려 매발톱나무라고 이름 지어졌다.





모데미풀

Megaleranthis saniculifolia Ohwi 미나리아재비과

4~5월 흰색 꽃이 짧은 꽃대 위마다 1개씩 피어난다. 깊은 산 계곡 주변과 습기가 많은 숲 속에서 자라며, 키는 20~40cm 가량이다.



백작약

Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda 작약과

4~6월 흰색 꽃이 줄기 끝에 1개씩 피는데, 꽃잎은 5~7장이다. 9월에 붉은 포가 벌어지며 그 속에서 검은색과 붉은색의 동그란 열매가 나온다.





벌깨덩굴

Meehania urticifolia (Miq.) Makino 꿀풀과

4~6월 줄기 위쪽 잎겨드랑이에서 보라색 꽃이 한 쪽을 향해 핀다. 꽃은 입술모양으로 윗입술은 2갈래로 갈라지고 아랫입술은 3갈래로 갈라진다.







벌노랑이

Lotus corniculatus var. *japonicus* Regel 콩과

5~6월 잎겨드랑이에서 나온 꽃대 끝에 2~3개씩 노란 꽃이 달리는데 나비모양을 하고 있다. 축축한 땅에 유난히 노란 빛깔의 꽃을 피워 벌노랑이라고 이름 지어졌다.



보리수나무

Elaeagnus umbellata Thunb. 보리수나무과

5월 잎겨드랑이에서 1~5개의 은빛 꽃이 핀다. 꽃끝은 4갈래로 갈라지며, 안쪽은 노란빛에서 점차 갈색으로 변한다. 불교에서 석가모니가 깨달음을 얻은 나무라 일컬어진다.

복수초

Adonis amurensis Regel & Radde 미나리아재비과

3~4월 줄기 끝에 노란 꽃이 1개씩 피는데, 꽃잎은 10~30장이다. 복수초(福壽草)는 황금과 같은 노란 꽃잎 때문에 복(福)과 장수(長壽)를 기원하는 의미에서 복수초라고 이름 지어졌다.







복주머니란

Cypripedium macranthos Sw. 난초과

멸종위기 야생생물 Ⅱ급종으로 5~7월 꽃은 연한 홍자색, 흰색, 분홍색 등으로 줄기 끝에 1개씩 핀다. 꽃잎이 주머니처럼 부풀고 주머니 안쪽에 털이 있어, 그의 모양을 빗대어 '개불알꽃'이라고도 한다. 꽃의 모양이 주머니를 연상시킨다고 하여 복주머니란이라고 이름 지어졌다.





산달래

Allium macrostemon Bunge 백합과

5~6월 하얀색 또는 연한 분홍색 꽃이 둥근 형태로 모여 핀다. 돌달래라고도 하며 포기 전체에서 마늘 향이 난다.



산새콩

Lathyrus vaniotii H. Lév. 콩과

6~7월 연한 홍자색 꽃이 잎겨드랑이에서 나온 꽃대에 모여 피며, 꽃 모양은 나비 모양이다. 키는 40~50cm 가량으로 우리나라 강원도 이북 산지에 자생한다.



선백미꽃

Cynanchum inamoenum (Maxim.) Loes. 박주가리과

7~8월 황색의 꽃이 피는데, 꽃잎 끝이 5갈래로 깊게 갈라지며 털이 없다. 줄기는 곧게 서고, 키는 30~60cm 가량이다.



세잎종덩굴

Clematis koreana Kom. 미나리아재비과

5~7월 흑자색 또는 황색 꽃이 종 모양으로 잎겨드랑이나 줄기 끝에서 나와 밑을 향해 핀다. 높은 산 중턱 이상에서 자라는 희귀식물이다.





아구장나무

Spiraea pubescens Turcz. 장미과

5~6월 흰색의 꽃이 어린 가지 끝에서 우산모양으로 모여 난다. 깊은 산의 건조한 바위틈에서 자라며 키는 150~200cm 가량이다.



애기괭이밥

Oxalis acetosella L. 괭이밥과

5~6월 줄기 끝에 흰색 꽃이 1개씩 핀다. 꽃잎은 5장이며 흰 바탕에 연한 자줏빛이 돈다. 드물게 연한 자주색 꽃이 피기도 한다.





애기나리

Disporum smilacinum A.Gray 백합과

4~5월 줄기나 가지 끝에서 흰색 꽃이 아래를 향해 1~2개씩 핀다. 줄기는 비스듬히 서며 키는 15~35cm 가량이다. 열매는 5월 검게 익는다.



애기똥풀

Chelidonium majus var. *asiaticum* (H. Hara) Ohwi 양귀비과

5~8월 줄기 끝에 황색의 꽃이 달린다. 꽃잎은 4개이며 긴 계란형이다. 상처를 내면 아기 똥 같은 등황색의 유액이 나와 애기똥풀이라고 이름 지어졌다.



애기풀

Polygala japonica Houtt. 원지과

산과 들에서 자라며, 4~5월 자주색 꽃이 피는데 꽃받침 5장이 꽃잎처럼 보인다. 키는 10~20cm 가량이며, 아기같이 작은 풀이라 하여 애기풀이라고 이름 지어졌다.





얼레지

Erythronium japonicum Decne. 백합과

4~5월 붉은 보라색 꽃이 1개씩 핀다. 꽃은 밑을 향하고 끝이 뒤로 말리며 꽃잎 안쪽 밑부분에 W자 모양이 있다. 잎에 얼룩이 있어 얼레지라고 이름 지어졌다.

연영초

Trillium tschonoskii Maxim. 백합과

높은 산 숲 속 계곡 주변에서 자라며, 4~6월 돌려난 잎 가운데서 나온 꽃대에 흰색으로 1송이의 꽃이 핀다. 꽃잎은 3장이다.





왜미나리아재비

Ranunculus franchetii H. Boissieu 미나리아재비과

4~5월 노란색으로 꽃이 피는데 꽃잎은 5장으로 계란형이다. 높은 산에서 자라며 키는 20~30cm 가량이다.



요강나물

Clematis fusca var. *coreana* (H. Lév. & Vaniot) Nakai 미나리아재비과

5~6월 검은빛이 도는 갈색 꽃이 밑을 향해 종 모양으로 가지 끝에 1개씩 달린다. 줄기는 곧게 서고 키는 30~100cm 가량이다.









으아리

Clematis terniflora var. *mandshurica* (Rupr.) Ohwi 미나리아재비과

5~9월 흰색 꽃이 가지 끝과 잎겨드랑이에서 모여나며 꽃잎은 4~6장이다. 햇볕이 잘 들고 습기가 있는 곳에 흔히 자라며 키는 2m 가량이다.

은방울꽃

Convallaria keiskei Miq. 백합과

4~5월 흰색 꽃이 높이 25~35cm 꽃대에 층을 이루며 10여 개가 땅을 향해 달린다. 꽃은 넓은 종모양이고 끝이 6갈래로 살짝 갈라진다. 꽃이 은방울의 모습을 닮아 은방울꽃이라고 이름 지어졌다.







제비꽃

Viola mandshurica W.Becker 제비꽃과

4~5월 짙은 자주색 꽃이 핀다. 꽃잎은 5장이며, 제비가 돌아올 무렵에 꽃이 핀다고 해서 제비꽃이라 이름 지어졌다.



족도리풀

Asarum sieboldii Miq 쥐방울덩굴과

4~5월 잎 사이에서 검은빛이 도는 자주색 꽃이 1개씩 핀다. 꽃봉오리의 모양이 옛날 부인들이 머리에 쓰던 족두리의 모습을 닮아 족도리풀이라고 이름 지어졌다. 잎 뒷면과 잎자루에 털이 많으면 '털족도리풀'이라고 불린다.





중의무릇

Gagea lutea (L.) Ker Gawl 백합과

3~5월 노란 꽃이 줄기 끝에서 나온 3~5개의 꽃대에 하나씩 핀다. 잎은 약간 안쪽으로 말리며 밑 부분이 줄기를 감싼다. 산지 숲 속에서 자라며, 키는 15~20cm 가량이다.





쥐오줌풀

Valeriana fauriei Briq. 마타리과

5~6월 연한 분홍색 또는 흰색의 꽃이 줄기 끝에서 꽃 무리를 이룬다. 꽃은 통 모양이고 끝이 5갈래로 갈라진다. 뿌리에서 나는 악취가 쥐 오줌 냄새와 비슷하다고 하여 쥐오줌풀이라고 이름 지어졌다. 열매에 털이 있는 것은 '광릉쥐오줌풀'이라 불린다.



지치

Lithospermum erythrorhizon Siebold & Zucc. 지치과

5~6월 흰색 꽃이 줄기 끝에 달리며 4mm정도로 작다. 석회암지대에서 많이 자라며, 전체적으로 털이 많고 키는 30~70cm 가량이다.



참개별꽃

Pseudostellaria coreana (Nakai) Ohwi 석죽과

4~5월 흰색 꽃이 줄기 끝에서 나온 꽃대에 1개씩 달린다. 꽃잎은 6~8장으로 끝이 2갈래로 약간 갈라진다. 키는 15~25cm 가량이며, 줄기에 세로로 흰 털이 있다.



처녀치마

Heloniopsis koreana S. Fuse, N. S. Lee & M. N. Tamura 백합과

4월에 분홍색 또는 보라색 꽃이 위쪽을 향해 빼곡히 모여 달린다. 꽃이 활짝 펴 사방으로 둥글게 퍼져있는 모습이 옛날 처녀들이 즐겨 입던 치마와 비슷하다 해서 처녀치마라고 이름 지어졌다. 잎 가장자리에 톱니가 없는 것은 '숙은처녀치마'라고 한다.



큰괭이밥

Oxalis obtriangulata Maxim. 괭이밥과

4~5월 붉은빛이 도는 흰색 꽃이 꽃줄기 끝에 1개씩 핀다. 꽃잎은 5장으로 꽃잎마다 자주색 줄이 여러 개 나있다.







큰구슬붕이

Gentiana zollingeri Fawc. 용담과

4~5월 자줏빛 꽃이 줄기 끝에 몇 개씩 모여 달린다. 줄기는 곧게 서고 잎은 줄기를 감싸며 어긋난다. 키는 5~10cm 가량이다.

큰앵초

Primula jesoana var. *pubescens* (Takeda) Takeda & H. Hara ex H. Hara 앵초과

5~6월 붉은 보라색 꽃이 1~4층으로 층층이 달려 각 층마다 5~6개씩 핀다. 높은 산의 습기 많은 숲 속이나 능선부 주변에서 자란다.





태백바람꽃

Anemone pendulisepala Y. N. Lee 미나리아재비과

4~5월 흰색 꽃이 줄기 끝에서 1개씩 핀다. 꽃잎처럼 보이는 꽃받침은 5~8장이며 밑으로 젖혀진다.





태백제비꽃

Viola albida Palib. 제비꽃과


4~5월 백색의 꽃이 잎 사이에서 나온 줄기 끝에 1개씩 달린다. 태백산에서 처음 발견되어 태백제비꽃이라고 이름 지어졌다.



털복주머니란

Cypripedium guttatum var. *koreanum* Nakai 난초과

5~6월 자주색 또는 분홍색 꽃이 핀다. 꽃잎에는 흰색 반점이 있고, 잎 가장자리와 잎 뒷면에 털이 있다. 복주머니란을 닮았고 털이 많아서 털복주머니란이라고 이름 지어졌다.






피나물

Hylomecon vernalis Maxim. 양귀비과

4~5월 줄기 끝부분에서 노란 꽃이 1~3개씩 핀다. 꽃잎은 보통 4장이고 마주보는 2장이 조금 더 크다. 줄기를 자르면 노란빛이 도는 붉은 즙이 나와 피나물이라고 한다.





한계령풀

Gymnospermium microrrhynchum (S. Moore) Takht. 매자나무과

4~5월 줄기 끝에 노란 꽃 10~20개가 누운 원뿔모양으로 빽빽하게 달린다. 꽃잎은 6장이다. 설악산 한계령에서 처음 발견되어 한계령풀이라고 이름 지어졌다.







할미꽃

Pulsatilla cernua var. *koreana* (Yabe ex Nakai) U. C. La 미나리아재비과

4~5월 줄기 끝에 붉은 자주색 꽃이 긴 종모양으로 아래를 향해 1개씩 핀다. 꽃대가 굽어 마치 할머니의 꼬부라진 등과 같다고 하여 할미꽃이라고 이름 지어졌다.

홀아비꽃대

Chloranthus japonicus Siebold 홀아비꽃대과

4~5월 흰색 꽃이 핀다. 꽃은 3cm정도 꽃대에 실이 빼곡히 달린 모양이다. 한 개의 꽃대에 하나의 꽃만 달린다는 뜻에서 홀아비꽃대라고 이름 지어졌다.




홀아비바람꽃

Anemone koraiensis Nakai 미나리아재비과

4~5월 백색의 꽃이 줄기 끝에 1개씩 달린다. 높은 산의 습한 곳에서 자라며 키는 7~10cm 가량이다.







검룡소 나도범의귀

2

summer

태백의

여름

각시서덜취

Saussurea macrolepis (Nakai) Kitam. 국화과

7~9월 자주색 머리모양 꽃이 줄기 끝에 하나 내지 여러 개가 핀다. 깊은 산 가장자리 그늘에서 자라며, 키는 30~90cm 가량이다.



개병풍

Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl. 범의귀과

6~7월 흰색 꽃이 줄기 끝에 모여 핀다. 잎은 방패 모양으로 큰 것은 지름 80cm 이상이다. 넓은 잎이 병풍과 유사하다고 해서 개병풍이라고 이름 지어졌다.





곰취

Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. 국화과

7~10월 줄기 끝에 노란 꽃이 종 모양으로 모여서 피어난다. 깊은 산속 곰이 뜯어먹던 나물이라는 뜻에서 곰취라고 이름 지어졌다.







구름병아리난초

Gymnadenia cucullata (L.) Rich. 난초과

멸종위기 야생생물 Ⅱ급종으로 7~9월 연한 자주색 또는 흰색의 꽃이 핀다. 꽃은 한쪽으로 치우쳐서 피어나며 줄기는 가늘고 곧게 선다. 크기는 10~25cm 가량이고, 잎은 줄기 아랫쪽에서 가까이 붙어 어긋난다.





구릿대

Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav. 산형과

6~8월 줄기 끝과 잎겨드랑이에서 나온 꽃대에 수북이 흰색 꽃이 펴 꽃 무리를 이룬다. 꽃잎은 5장으로 계란형이며 안으로 말린다.

긴산꼬리풀

Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz 현삼과

7~8월 푸른 자주색 꽃이 줄기 끝에 원뿔모양으로 모여서 피어난다. 꽃의 모습이 꼬리를 닮았고 산꼬리풀보다 꽃이 길어 긴산꼬리풀이라고 이름 지어졌다.



꽃층층이꽃

Clinopodium chinense var. *parviflorum* (Kudô) H. Hara 꿀풀과

7~8월 붉은 보라색 꽃이 줄기 위쪽에 층층이 핀다. 꽃은 입술모양으로 윗입술은 오목하고 아랫입술은 3갈래다.



꿀풀

Prunella asiatica Nakai 꿀풀과

햇볕이 잘 드는 나지, 초지에 흔하게 자라며 5~7월 줄기 끝에 원통모양을 따라 빽빽하게 보라색, 분홍색, 흰색 꽃이 입술모양으로 핀다. 꽃에 꿀이 많아서 꿀풀이라고 이름 지어졌다.





나도수정초

Monotropastrum humile (D. Don) H. Hara 노루발과

4~8월 줄기 끝에 종 모양의 흰색 꽃 1개가 밑을 향해 피며, 엽록소가 없어서 광합성을 하지 않는다. 줄기는 곧게 서고 전체가 흰색이다.



날개하늘나리

Lilium dauricum KerGawl. 백합과

멸종위기 야생생물 Ⅱ급종으로 7~8월 1~6개의 황적색 꽃이 하늘을 향해 핀다. 꽃잎은 6장이고 꽃잎에 자주색 반점이 있다. 줄기에 날개모양의 세로줄이 있어 날개하늘나리라고 이름 지어졌다.







넓은잔대

Adenophora divaricata Franch. & Sav. 초롱꽃과

7~8월 푸른 보라색 꽃이 종 모양으로 줄기 끝에서 피어난다. 줄기는 곧게 서서 50~100cm 가량이며, 잎은 타원형 또는 좁은 계란형으로 3~4개가 돌려난다.

노루발

Pyrola japonica Klenze ex Alef. 노루발과

6~7월 흰색 꽃이 줄기 끝에서 5~12개씩 밑을 향해 피어난다. 잎이 노루의 발자국을 닮아서 노루발이라고 이름 지어졌다.



동자꽃

Lychnis cognata Maxim. 석죽과

6~8월 주황 꽃이 잎겨드랑이에서 앞을 보고 핀다. 줄기는 곧게 서며, 키는 40~120cm 가량이다.





둥근이질풀

Geranium koreanum Kom. 쥐손이풀과

6~7월 연분홍색으로 꽃이 피며, 꽃잎은 5개다. 꽃잎 모양이 둥글고 이질병 치료에 쓰인다 하여 둥근이질풀이라고 이름 지어졌다.





딱지꽃

Potentilla chinensis Ser. 장미과

6~7월 노란 꽃이 가지 끝에 1~2개씩 모여 피며 줄기와 잎에 긴 솜털이 많다. 줄기는 30~60cm 가량이며, 잎의 뒷면에 흰 솜털이 많다.





말나리

Lilium distichum Nakai 백합과

7~8월 등적색 꽃이 1~10개씩 옆을 향해 핀다. 줄기에 4~9개 긴 타원형의 잎이 돌려난다. 꽃이나 잎이 나리보다 커서 말나리라고 이름 지어졌다.



모시대

Adenophora remotiflora (Siebold & Zucc.) Miq. 초롱꽃과

7~9월 보라색 종 모양 꽃이 아래를 향해 핀다. 꽃은 드물게 흰색이기도 하며 끝이 5갈래로 벌어진다.





물꽈리아재비

Mimulus nepalensis Benth. 현삼과

7~9월 노란 꽃이 1개씩 피어난다. 꽃잎은 입술 모양이고 끝이 5갈래로 깊게 갈라진다. 물가나 습기가 많은 곳에 자라며, 키는 10~30cm 가량이다.







물레나물

Hypericum ascyron L. 물레나물과

6~8월 노란 꽃이 줄기와 가지 끝에 피며 꽃잎은 낫 모양의 넓은 달걀형이다. 꽃 모양이 물레를 연상하게 해 물레나물이라고 이름 지어졌다.





물봉선

Impatiens textori Miq. 봉선화과

8~9월 홍자색 꽃이 가지 끝에 피어나며, 꽃은 입술모양으로 큰 꽃잎 안쪽에 자주색 반점이 있다. 물이 많은 곳에서 자라는 봉선화라 하여 물봉선이라고 이름 지어졌다.

물양지꽃

Potentilla cryptotaeniae Nakai 장미과

7~8월 노란 꽃이 줄기 끝에 달리는데, 꽃잎은 끝이 갈라져 하트모양처럼 보인다. 물가에서 피는 양지꽃이라 하여 물양지꽃이라고 이름 지어졌다.



박주가리

Metaplexis japonica (Thunb.) Makino 박주가리과

7~8월 흰색 또는 연한 보라색 꽃이 잎겨드랑이에서 나온 꽃대에 모여 핀다. 박을 닮은 열매가 익으면서 쪼개지는데 이를 보고 박쪼가리라 부르던 것이 변해 박주가리라고 이름 지어졌다.





박쥐나무

Alangium platanifolium var. *trilobum* (Miq.) Ohwi 박쥐나무과

6~7월 잎겨드랑이에서 나온 꽃대에 꽃이 1~4개씩 듬성듬성 피어나 아래를 향한다. 꽃은 노란빛이 도는 흰색이며 꽃받침은 둥근 고리모양이다. 잎 모양이 박쥐의 날개를 닮아서 박쥐나무라 이름 지어졌다.

배초향

Agastache rugosa (Fisch. & C. A. Mey.) Kuntze 꿀풀과

7~9월 자주색 꽃이 줄기 끝에 솔 모양으로 빽빽하게 달린다. 거친 것을 물리치는 향기를 가진 식물이라 하여 배초향(排草香)이라고 이름 지어졌다.



백당나무

Viburnum opulus var. *calvescens* (Rehder) H. Hara 인동과

5~6월 햇가지 끝에서 흰색 꽃이 피는데, 가장자리에는 생식 기능이 없는 중성 꽃이 피고 안쪽에는 양성 꽃이 달린다. 고도가 낮은 산지에서 자라며, 키는 3~6m 가량이다.



벌완두

Vicia amurensis Oett. 콩과

6~8월 남자색 꽃이 꽃대 위쪽 1cm에 빼곡하게 줄지어 핀다. 꽃은 나비 모양이고 산지의 양지에서 자란다. 덩굴성 식물로 잎 끝이 2~3개로 갈라져 덩굴손이 된다.







범꼬리

Bistorta manshuriensis Kom. 마디풀과

6~8월 꽃이 줄기 끝에 다닥다닥 붙어 솔처럼 핀다. 색은 연한 분홍색 또는 흰색이다. 꽃의 모양이 범의 꼬리를 닮아서 범꼬리라고 이름 지어졌다.

병조희풀

Clematis heracleifolia DC 미나리아재비과

7~8월 하늘색 또는 보라색, 드물게 흰색으로 꽃이 피며, 모양은 밑이 볼록하고 윗부분은 4갈래로 갈라져 끝이 뒤로 말린다. 꽃이 병모양을 닮아 병조희풀이라 이름 지어졌다.





분홍바늘꽃

Epilobium angustifolium L. 바늘꽃과

7~8월 붉은 보라색 꽃이 줄기를 따라 쭉 피어나며 꽃잎은 4개이다. 높은 산 양지에서 자라며 군락을 이룬다. 줄기는 곧추서며 키는 50~150cm 가량이다.





산꿩의다리

Thalictrum filamentosum Maxim. 미나리아재비과

6~7월 흰색 꽃이 줄기 끝에 모여난다. 줄기는 곧추서며, 키는 20~60cm 가량이다. 꽃대가 꿩의 다리처럼 날씬하게 생겨서 산꿩의다리라고 이름 지어졌다.







산마늘

Allium microdictyon Prokh 백합과

6~7월 흰색 또는 연한 붉은색 꽃이 줄기 끝에 둥근형태로 모여핀다. 전체적으로 마늘냄새가 나서 산마늘이라 이름 지어졌으며, 일부 지역에선 명이나물이라고 부르기도 한다.

산솜방망이

Tephroseris flammea (Turcz. ex DC.) Holub 국화과

7~9월 붉은빛이 도는 노란 꽃이 줄기 끝에 핀다. 꽃은 머리에 우산살이 2~10개가 달린 모양이다. 줄기는 곧추서며, 키는 15~30cm 가량이다.



산토끼꽃

Dipsacus japonicus Miq. 산토끼꽃과

8월 홍자색 꽃이 긴 꽃대 끝에 머리모양으로 핀다. 산지 햇볕이 잘 드는 곳에서 자라며, 줄기는 곧추서고 키는 1m 가량이다.







석잠풀

Stachys japonica Miq. 꿀풀과

6~8월 줄기 위쪽 잎겨드랑이에서 연한 자주색 꽃이 6~8개씩 층층이 돌려나며, 입술모양을 하고 있다. 아랫입술이 윗입술보다 길다.



세잎쥐손이

Geranium wilfordii Maxim. 쥐손이풀과

8~10월 잎겨드랑이에서 난 꽃대에 연한 붉은색 꽃이 2개씩 핀다. 꽃잎은 5장으로 붉은 줄이 있다.



속단

Phlomis umbrosa Turcz. 꿀풀과

7~8월 분홍색 또는 드물게 흰색인 꽃이 줄기 위 잎겨드랑이에서 몇 개씩 층층이 돌려난다. 잎은 마주나고 가장자리에 톱니가 있다.







솔나리

Lilium cernuum Kom. 백합과

7~8월 분홍색 또는 붉은 보라색의 꽃이 줄기 끝에 1~6개씩 옆이나 밑을 향해 핀다. 꽃은 드물게 흰색일 때도 있다. 잎이 솔잎처럼 가늘어서 솔나리라고 이름 지어졌다.





송장풀

Leonurus macranthus Maxim. 꿀풀과

8월에 연한 홍색 또는 흰색 꽃이 줄기 윗부분의 잎겨드랑이에서 5~6개씩 핀다. 줄기는 네모 모양으로 만져보면 각이 있고 곧게 자란다. 키는 60~120cm 가량이다.



쇠서나물

Picris hieracioides var. *koreana* (Kitam.) Kitam. 국화과

6~10월 가지 끝에 머리모양의 꽃이 진한 노란색부터 흰빛이 도는 노란색까지 다양한 색으로 피어난다. 잎 모양이 길게 내민 소의 혀를 닮아 쇠서나물이라 이름 지어졌다.

숙은노루오줌

Astilbe koreana (Kom.) Nakai 범의귀과

6~7월 흰색 또는 연한 붉은색 꽃이 핀다. 꽃은 줄기 위 쪽으로 빼곡하게 피어나며 꽃대가 곧게 서지않고 약간 수그러진다. 꽃줄기가 휘고 뿌리에서 노루오줌 냄새가 나서 숙은노루오줌이라 이름 지어졌다.





쉬땅나무

Sorbaria sorbifolia var. *stellipila* Maxim. 장미과

6~7월 흰색 꽃이 가지 끝에 먼지떨이처럼 모여서 피어난다. 꽃 모양이 수수이삭처럼 보여 쉬땅나무라고 이름 지어졌다.



어수리

Heracleum moellendorffii Hance 산형과

7~8월 백색 꽃 25~30개가 가지 끝에 우산형으로 모여 핀다. 바깥쪽 꽃의 크기가 안쪽 꽃보다 훨씬 크다.





엉겅퀴

Cirsium japonicum var. *ussuriense* (Regel) Kitam. 국화과

6~8월 줄기와 가지 끝에 붉은 보라색 또는 드물게 흰색 꽃이 핀다. 어긋나는 잎은 줄기를 감싸고 여러갈래로 깊게 갈라진다.





여우오줌

Carpesium macrocephalum Franch. & Sav. 국화과

8~10월 노란 꽃이 가지 끝에 머리모양으로 1개씩 핀다. 숲의 가장자리 축축한 곳에서 자라며, 키는 80~150cm 가량이다. 잎은 어긋난다.



오리방풀

Isodon excisus (Maxim.) Kudo 꿀풀과

6~8월 보라색 꽃이 잎겨드랑이와 줄기 끝에서 나온 꽃대에 피며, 꽃대의 길이는 5~20cm이다. 꽃잎은 입술 모양이고 줄기는 곧게 자라 50~100cm 가량이다.





오이풀

Sanguisorba officinalis L. 장미과

7~9월 꽃이 진한 붉은색 또는 드물게 흰색으로 줄기 끝에 빽빽하게 피어난다. 상처가 나면 오이냄새가 나서 오이풀이라 이름 지어졌다.

우산나물

Pleurospermum camtschaticum Hoffm. 산형과

6~8월 분홍색을 띄는 흰색 꽃이 핀다. 꽃은 5갈래로 깊게 갈라지고 전체적으로 통 모양이다. 새순이 올라와 잎이 채 벌어지기 전의 모습이 우산을 펼친 것처럼 보여 우산나물이라고 이름 지어졌다.







익모초

Leonurus japonicus Houtt. 꿀풀과

7~8월 홍자색 꽃이 층층으로 잎겨드랑이에서 몇 개씩 핀다. 산지와 들의 햇볕이 잘 드는 길가나 공터에 자라며, 전체적으로 흰 털이 난다. 줄기는 곧게 서고, 키는 30~100cm 가량이다.







일월비비추

Hosta capitata (Koidz.) Nakai 백합과

6~8월 연한 보라색 꽃이 한 줄기에 몇 개씩 모여서 달린다. 꽃잎은 4~5cm 배 모양으로 볼록하다. 일월산에서 처음 발견되어 일월비비추라고 이름 지어졌다.

자주꽃방망이

Campanula glomerata var. *dahurica* Fisch. ex Ker Gawl 초롱꽃과

8~10월 줄기 끝과 위쪽 잎겨드랑이에서 보라색 꽃이 모여서 핀다. 꽃은 종 모양에 끝이 5갈래로 조금 깊게 갈라지며 드물게 흰색 꽃이 피기도 한다.





짚신나물

Agrimonia pilosa Ledeb. 장미과

6~8월 황색 꽃이 줄기 끝을 따라 줄줄이 달리고 꽃 밑에 갈고리 같은 털이 있다. 열매에 붙어있는 갈고리 모양의 털이 짚신에 잘 달라붙어 짚신나물이라고 이름 지어졌다.



참기생꽃

Trientalis europaea L. 앵초과

6~7월 흰색 또는 연분홍색 꽃이 줄기 끝에서 1~2개씩 핀다. 키는 4~20cm 가량이다. 전체적으로 털이 없고 가지가 갈라지지 않는다.









참나물

Pimpinella brachycarpa (Kom.) Nakai 산형과

6~8월 흰색 꽃이 줄기 끝에서 나온 꽃대에 우산모양을 이루며 모여 핀다. 산 숲 속 그늘에 흔하게 자라는 풀로 키는 50~80cm 가량이다.



참조팝나무

Spiraea fritschiana C. K. Schneid. 장미과

5~6월 가지 끝에 붉은빛이 도는 흰 꽃이 우산모양으로 많이 모여서 핀다. 키는 1~2m 가량이며 수피는 연한 갈색 또는 붉은 갈색을 띤다.

초롱꽃

Campanula punctata Lam. 초롱꽃과

5~7월 흰색의 종 모양 꽃이 줄기 끝에서 아래를 향해 피어난다. 꽃 끝이 5갈래로 얕게 갈라지며 꽃 안쪽에 붉은 보라색 점이 있다. 꽃 모양이 청사초롱의 초롱을 닮았다고 하여 초롱꽃이라고 이름 지어졌다.









층층잔대

Adenophora verticillata Fisch. 초롱꽃과

7~9월 하늘색 꽃이 줄기를 따라 층층이 피어난다. 때론 돌려나기도 한다. 꽃은 종모양으로 끝이 오므라져있다. 키는 70~180cm 가량이다







큰까치수염

Lysimachia clethroides Duby 앵초과

6~8월 한쪽으로 기울어진 꽃대를 따라 흰 꽃이 다닥다닥 달린다. 줄기는 곧게 서서 밑동이 붉은 보라색을 띠며, 키는 50~100cm 가량이다. 줄기 전체엔 털이 거의 없으나 윗부분과 꽃대에는 털이 조금 난다.

큰뱀무

Geum aleppicum Jacq 장미과

6~7월 노란 꽃이 가지 끝에 한 개씩 피며 꽃잎은 5장이다. 전체적으로 거친 털이 많고, 키는 30~100cm 가량이다. 꽃잎과 키가 큰 뱀무여서 큰뱀무라고 이름 지어졌다.



2017. 07. 큰뱀무

큰제비고깔

Delphinium maackianum Regel 미나리아재비과

7~9월 보라색 또는 흰색 꽃이 줄기를 따라 돌려가며 핀다. 꽃이 제비처럼 예쁘고 고깔을 닮아 큰제비고깔이라고 이름 지어졌다.







타래난초

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames 난초과

5~8월 분홍색 꽃이 꽃대를 실타래처럼 감아가며 옆을 향해 핀다. 꽃이 타래와 같이 나선상으로 꼬이면서 피어나 타래난초라고 이름 지어졌다.

태백기린초

Sedum latiovalifolium Y. N. Lee 돌나물과

6~7월 노란 꽃이 가지 끝에 5~7개가 붙어 모여 핀다. 꽃잎은 5개고 끝이 꼬리처럼 뾰족해진다. 태백산에서 처음 발견되어 태백기린초라고 이름 지어졌다.



터리풀

Filipendula glaberrima Nakai 장미과

7~8월 백색의 꽃이 가지 끝에 솜 뭉치처럼 모여 자란다. 꽃잎은 4~5개이다. 꽃의 모양이 먼지떨이처럼 생겨서 터리풀이라고 이름 지어졌다.





털중나리

Lilium amabile Palib. 백합과

6~8월 황적색 꽃이 가지 끝에 1~5개씩 밑을 향해 피어난다. 꽃잎은 6개이다. 줄기와 꽃 밑에 털이 있고 꽃이 하늘과 땅의 중간을 바라보며 피어 털중나리라 이름 지어졌다.





하늘말나리

Lilium tsingtauense Gilg 백합과

6~8월 줄기 끝에서 1~6개씩 위를 향해 붉은 꽃이 핀다. 잎이 줄기 가운데서 6~15장이 돌려난다. 꽃이 하늘을 향해 피고 크기가 커 하늘말나리라고 이름 지어졌다.



함박꽃나무

Magnolia sieboldii K. Koch 목련과

5~6월 흰색의 꽃이 옆 또는 밑을 향해 피며, 꽃잎은 6~9장이다. 높이는 6~10m 가량으로 회백색의 나무껍질을 가지고 있다. 9월에 열매가 익으면 흰 실이 달린 씨가 나온다.

3
fall
태백의
가을



가지금불초

Inula britannica var. *ramosa* Kom. 국화과

7~9월 노란 꽃이 줄기 끝에서 피어난다. 꽃의 지름은 3~4cm 정도이다. 꽃의 색이 황금빛 부처님 같다고 해서 가지금불초(金佛草)라고 이름 지어졌다.

각시취

Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch. 국화과

8~10월 자주색 혹은 흰색 꽃이 줄기 끝에 머리모양으로 핀다. 작고 예쁜 취나물이라 해서 각시취라고 이름 지어졌다.



개미취

Aster tataricus L. f. 국화과

8~10월 분홍빛을 띤 자주색 꽃이 줄기 끝에 피어나며 꽃 무리를 이룬다. 키는 100~150cm 가량이며, 줄기에 짧은 털이 난다.







개버무리

Clematis serratifolia Rehder 미나리아재비과

8월 말~9월 초 연한 노란색 꽃이 잎겨드랑이와 가지 끝에서 3~6개씩 밑을 향해 달린다. 저지대에서 자라며, 열매가 나올 때 긴 깃털 모양으로 암술대가 남아 있다.

갯쑥부쟁이

Aster hispidus Thunb. 국화과

8~11월 연한 자주색 또는 흰색 꽃이 줄기 끝에서 1개씩 피어난다. 줄기는 곧게 서며, 키는 30~100cm로 가량이다. 숲의 가장자리와 해안가의 건조한 풀밭에서 자란다.



고려엉겅퀴

Cirsium setidens (Dunn) Nakai 국화과

7~10월 자주색 꽃이 줄기 끝에서 위를 향해 1개씩 핀다. 높이는 1m 가량이며, 잎에는 털이 약간 있다. 강원도에서는 곤드레나물이라 부른다.





과남풀

Gentiana triflora var. *japonica* (Kusn.) H. Hara 용담과

8~10월 보라색 꽃이 줄기 끝과 잎겨드랑이에서 여러 개 피어난다. 꽃은 종 모양으로 앞이 5~6갈래로 갈라진다. 등산로 주변에서 자라고 줄기는 곧게 서며 키가 100cm 가량이다.





구절초

Dendranthema zawadskii var. *latilobum* (Maxim.) Kitam. 국화과

7~11월 흰색 또는 분홍빛이 도는 흰색 꽃이 핀다. 음력 9월 9일이 되면 줄기가 9마디로 변한다고 해서 이름 지어졌다.



궁궁이

Angelica polymorpha Maxim. 산형과

8~9월 백색 꽃 20~40여 개가 우산형으로 모여 핀다. 산골짜기에서 자라며, 키는 80~150cm 가량이다. 열매는 날개가 달린 납작한 타원형으로 9~10월에 익는다.



꼬인용담

Gentianopsis contorta (Royle) Ma 용담과

높은 산에서 아주 드물게 자라며, 8~9월 청자색 꽃이 줄기 끝마다 1개씩 피어난다. 태백산에서 처음 발견 되었다. 꽃잎이 나선형으로 꼬여서 피어나 꼬인용담이라고 이름 지어졌다.



꽃향유

Elsholtzia splendens Nakai ex F.Maek. 꿀풀과

9~10월 자주색 꽃이 빽빽하게 피어나며 꽃대 바로 밑에 잎이 있다. 향유와 비슷한 향이 나는데 꽃이 크고 화려해서 꽃향유라고 이름 지어졌다.



꿩의비름

Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H.Ohba 돌나물과

8~9월 백색 바탕에 붉은빛이 도는 꽃이 줄기 끝에 빼곡히 피어난다. 잎은 다육질로 마주나거나 어긋난다.



나도송이풀

Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz 현삼과

8~9월 연한 홍자색 꽃이 줄기 위쪽 잎겨드랑이에서 핀다. 꽃은 전체적으로 통 모양이며 꽃잎 끝은 입술 모양을 하고 있다.





놋젓가락나물

Aconitum ciliare DC. 미나리아재비과

8~9월 연한 자주색 꽃이 가지 끝에 몇 개씩 모여 핀다. 잎은 어긋나고 손바닥 모양으로 3~5갈래로 갈라진다.

눈빛승마

Cimicifuga dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Maxim. 미나리아재비과

8월에 흰색 꽃이 흰색 털과 함께 전체적으로 원뿔모양을 이루며 핀다. 꽃의 색이 눈처럼 흰 승마라고 해서 눈빛승마라고 이름 지어졌다.



더덕

Codonopsis lanceolata (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. ex Trautv. 초롱꽃과

8~9월 연한 녹색 꽃이 가지 끝에서 1개씩 핀다. 꽃은 종 모양으로 끝이 5갈래로 갈라져 뒤로 말린다. 열매가 더덕더덕 붙어나는 생김새에서 이름 지어졌다.







산국

Dendranthema boreale (Makino) Ling ex Kitam. 국화과

9~11월 노란색 꽃이 줄기 끝에 모여서 피어난다. 산에서 자라는 국화라는 뜻에서 산국이라고 이름 지어졌다.



산비장이

Serratula coronata subsp. *insularis* (Iljin) Kitam. 국화과

8~10월 자주색 꽃이 머리모양으로 줄기 끝에서 핀다. 줄기는 곧게 서며, 키는 30~150cm 가량이다. 원통모양의 열매가 11월에 맺힌다.

산외

Schizopepon bryoniifolius Maxim. 박과

8~9월 녹색이 도는 흰색 꽃이 암꽃은 잎 겨드랑이에 1개씩 피고, 수꽃은 여러 개가 모여 피어 꽃 무리를 이룬다.



산톱풀

Achillea alpina var. *discoidea* (Regel) Kitam. 국화과

7~10월 백색 또는 연한 홍색 꽃이 줄기 끝에 우산모양으로 피어난다. 줄기는 곧게 서고, 키는 30~100cm 가량으로 위쪽에 털이 많다. 북부지방의 높은 산에서 주로 자란다.







수리취

Synurus deltoides (Aiton) Nakai 국화과

9~10월 검은빛이 도는 자주색 꽃이 줄기 끝에서 1개씩 달려 밑을 향한다. 햇빛이 드는 숲 가장자리나 건조한 풀밭에서 자라며, 줄기는 곧게 서 50~100cm 가량이고 흰 털이 난다.

오갈피나무

Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) S.Y.Hu 두릅나무과

8월 중순 ~ 9월 말 가지 끝에 둥근 형태로 모여 피며, 꽃 하나하나는 삼각형이다. 잎이 5갈래로 갈라져 오갈피나무라고 이름 지어졌다.



자주쓴풀

Swertia pseudochinensis H. Hara 용담과

9~10월 자주색 꽃이 줄기 윗부분에 달려 전체가 원뿔 모양이 된다. 꽃잎은 5개이며 줄기는 네모지다. 키는 15~40cm 가량이다.



좀개미취

Aster maackii Regel 국화과

8~10월 자주색 꽃이 가지 끝에서 핀다. 산지 또는 냇가의 모래땅에서 자라며 키는 45~85cm 가량이다. 개미취에 비해 전반적으로 작아서 좀개미취라고 이름 지어졌다.









좁은잎덩굴용담

Pterygocalyx volubilis Maxim. 용담과

9~10월 붉은 자주색 꽃이 잎겨드랑이에서 1개씩 핀다. 꽃은 밑으로 처지고 3cm 정도이다. 덩굴성 풀로 줄기는 매우 가늘고 다른 물체를 감고 올라간다.





진범

Aconitum pseudolaeve Nakai 미나리아재비과

8월 연한 자주색 꽃이 줄기 끝과 잎겨드랑이마다 피어난다. 꽃 모양이 오리 모습을 하고 있다. 키는 30~80cm 가량이며 열매는 삼각형 모양으로 10~11월에 달린다.



참당귀

Angelica gigas Nakai 산형과

8~9월 자주색의 꽃이 우산형으로 펼쳐진 15~20개의 꽃대에 20~40개씩 피어난다. 줄기는 곧게 서며 자줏빛이 돌고 키는 100~200cm 가량이다. 뿌리에서 향기가 난다.

참취

Aster scaber Thunb. 국화과

8~10월 흰색 꽃이 가지 끝에 많은 수가 모여 달린다. 숲 가장자리나 햇빛이 드는 곳에서 자라며, 키는 100~150cm 가량이다. 열매는 11월에 익으며 흑백색의 털이 있다.





큰엉겅퀴

Cirsium pendulum Fisch. ex DC. 국화과

7~10월 자줏빛 꽃이 가지 끝에서 밑을 향해 핀다. 줄기는 곧게 서서 100~200cm 가량이며 세로줄과 거미줄 같은 털이 있다. 키가 큰 엉겅퀴라 해 큰엉겅퀴라고 이름 지어졌다.

태백이질풀

Geranium taebaekensis S.J.Park & Y.S.Kim 쥐손이풀과

8~9월 분홍색 꽃이 줄기 끝에 2개씩 달린다. 꽃이 크고 꽃잎 끝이 2갈래로 깊게 갈라지며, 줄기에 털이 많은 것이 특징이다. 태백산에서 처음 발견되어 태백이질풀이라고 이름 지어졌다.



투구꽃

Aconitum jaluense Kom. 미나리아재비과

9월 자주색 꽃이 줄기 끝과 잎겨드랑이에서 나온 꽃대에 핀다. 꽃은 고깔모양이다. 꽃의 모양이 투구를 닮았다고 해서 투구꽃이라고 이름 지어졌다.





흰바디나물

Angelica cartilagino-marginata var. *distans* (Nakai) Kitag. 산형과

7~9월 흰색 꽃이 줄기 끝에서 10여 개씩 모여 난다. 산지의 축축하고 그늘진 곳에서 자라며, 줄기는 곧게 서고 털이 없다.


백천계곡 열목어

태백산에 피고 지는
우리 꽃

INDEX

1
spring
태백의
봄

ㄱ		등칡	32	은방울꽃	55
각시붓꽃	08	ㅁ		ㅈ	
갈퀴현호색	09	매발톱나무	33	제비꽃	56
감자난초	10	모데미풀	34	족도리풀	57
구슬붕이	11	ㅂ		중의무릇	58
금강애기나리	12	백작약	35	쥐오줌풀	59
금강제비꽃	13	벌깨덩굴	36	지치	60
꽃쥐손이	14	벌노랑이	37	ㅊ	
꿩의바람꽃	15	보리수나무	38	참개별꽃	61
ㄴ		복수초	39	처녀치마	62
나도개감채	16	복주머니란	40	ㅋ	
나도바람꽃	17	ㅅ		큰괭이밥	63
나도범의귀	18	산달래	41	큰구슬붕이	64
나도옥잠화	19	산새콩	42	큰앵초	65
나도제비란	20	선백미꽃	43	ㅌ	
너도바람꽃	21	세잎종덩굴	44	태백바람꽃	66
노란장대	22	ㅇ		태백제비꽃	67
노랑갈퀴	23	아구장나무	45	털복주머니란	68
노랑무늬붓꽃	24	애기괭이밥	46	ㅍ	
노랑제비꽃	25	애기나리	47	피나물	69
노루귀	26	애기똥풀	48	ㅎ	
노루삼	27	애기풀	49	한계령풀	70
ㄷ		얼레지	50	할미꽃	71
당개지치	28	연영초	51	홀아비꽃대	72
대성쓴풀	29	왜미나리아재비	52	홀아비바람꽃	73
동의나물	30	요강나물	53		
두루미꽃	31	으아리	54		

2
summer
태백의
여름

ㄱ		박쥐나무	98	익모초	123
각시서덜취	76	배초향	99	일월비비추	124
개병풍	77	백당나무	100	ㅈ	
곰취	78	벌완두	101	자주꽃방망이	125
구름병아리난초	79	범꼬리	102	짚신나물	126
구릿대	80	병조희풀	103	ㅊ	
긴산꼬리풀	81	분홍바늘꽃	104	참기생꽃	127
꽃층층이꽃	82	ㅅ		참나물	128
꿀풀	83	산꿩의다리	105	참조팝나무	129
ㄴ		산마늘	106	초롱꽃	130
나도수정초	84	산솜방망이	107	층층잔대	131
날개하늘나리	85	산토끼꽃	108	ㅋ	
넓은잔대	86	석잠풀	109	큰까치수염	132
노루발	87	세잎쥐손이	110	큰뱀무	133
ㄷ		속단	111	큰제비고깔	134
동자꽃	88	솔나리	112	ㅌ	
둥근이질풀	89	송장풀	113	타래난초	135
딱지꽃	90	쇠서나물	114	태백기린초	136
ㅁ		숙은노루오줌	115	터리풀	137
말나리	91	쉬땅나무	116	털중나리	138
모시대	92	ㅇ		ㅎ	
물꽈리아재비	93	어수리	117	하늘말나리	139
물레나물	94	엉겅퀴	118	함박꽃나무	140
물봉선	95	여우오줌	119		
물양지꽃	96	오리방풀	120		
ㅂ		오이풀	121		
박주가리	97	우산나물	122		

ㄱ	
가지금불초	142
각시취	143
개미취	144
개버무리	145
갯쑥부쟁이	146
고려엉겅퀴	147
과남풀	148
구절초	149
궁궁이	150
꼬인용담	151
꽃향유	152
꿩의비름	153
ㄴ	
나도송이풀	154
놋젓가락나물	155
눈빛승마	156
ㄷ	
더덕	157
ㅅ	
산국	158
산비장이	159
산외	160
산톱풀	161
수리취	162
ㅇ	
오갈피나무	163
ㅈ	
자주쓴풀	164
좀개미취	165
좁은잎덩굴용담	166
진범	167
ㅊ	
참당귀	168
참취	169
ㅋ	
큰엉겅퀴	170
ㅌ	
태백이질풀	171
투구꽃	172
ㅎ	
흰바디나물	173

태백산에 피고 지는
우리 꽃

| 발 행 처 | 국립공원관리공단 태백산국립공원사무소
(26043) 강원도 태백시 태백산로 4778
| 전　　화 | Tel. 033.550.0000 / Fax. 033.552.7836
| 홈페이지 | http://taebaek.knps.or.kr
| 사　　진 | 태백산국립공원사무소
| 그　　림 | 이해복

본 출판물은 저작권법에 따라 보호되는 저작물이므로 국립공원관리공단 태백산국립공원사무소의 사전 승인없이 무단 복제 및 전재를 금합니다.